

ПРОФИЛАКТИКА ПЕДИКУЛЕЗА В ДОУ

Педикулезом называют поражение кожи и волос на теле человека **вшами**. Пищей таким паразитам служит кровь и лимфатическая жидкость жертвы. Особенно часто этому заболеванию подвергаются люди, живущие в антисанитарных условиях. Однако рискует заразиться этой болезнью даже самодостаточный человек. Не являются исключением и дети. Во время контакта паразиты очень быстро проникают на волосы и кожу, в связи, с чем оградить ребенка от данной проблемы при посещении дошкольного и учебного образовательного учреждения весьма непросто. Поэтому профилактика педикулеза в детском саду является одним из самых актуальных вопросов.

Причины заражения

Даже один ребенок, зараженный вшами, представляет серьезную опасность для всей группы в детском саду. Причин педикулеза несколько. Основные способы, **как передаются вши**:

- 1) прямой контакт – объятия, совместные игры или прикасания к голове;
- 2) обмен вещами, головными уборами, а также предметами ухода за волосами (расческами, заколками, обручами или резинками) способствует переносу вшей и их яиц на чистую голову ребенка;
- 3) общая постель – достаточно часто во время тихого часа дети могут ворочаться, ложась на чужую постель.



Основными признаками поражения головы ребенка вшами являются:

- **укусы вшей** становятся причиной сильного зуда;
- наличие ранок и расчесов в местах повреждения кожного покрова;

- при тщательном осмотре можно обнаружить не только яйца насекомых (гниды), но и самих вшей.

Обнаружив **симптомы педикулеза у ребенка**, медсестра должна немедленно предпринимать соответствующие меры.

Профилактические мероприятия

Вопрос борьбы со вшивостью и **лечение педикулеза** стоит на повестке дня каждого детского учреждения. Заразиться педикулезом можно даже при соблюдении правил личной гигиены. Поэтому Минздравом разработано специальное распоряжение по педикулезу в образовательных организациях, согласно которому принимать зараженных вшами и гнидами детей в детсады запрещается.

Для осмотра мед. работник должен использовать специальный гребень с частыми зубьями, который впоследствии в обязательном порядке дезинфицируется. Только регулярный осмотр детей на педикулез в детсаду поможет предотвратить распространение заболевания. Согласно постановлению санитарно-эпидемиологической службы, он должен проводиться ежемесячно. Данные записываются в **журнал осмотра на педикулез**.

Информация о педикулезе должна предоставляться вниманию родителей на специально организованных родительских собраниях. Также существует инструкция по педикулезу для воспитателей и педагогов. В ней указаны сведения о профилактических правилах, способствующих предупреждению заболевания.

Действия медсестры при педикулезе должны проводиться в следующем порядке:

- 1)Обнаружив вши у ребенка, медицинская сестра обязана изолировать его, сообщив об этом родителям и администрации ДООУ.
- 2)В обязательном порядке следует осматривать детей, которые имели контакт с зараженным ребенком.
- 3)Рекомендовать родителям программу профилактических мероприятий в домашних условиях.
- 4)Обязательной является дезинфекция помещения, в том числе и обработка постельного белья, которые предусматривают карантинные мероприятия в ДООУ.
- 5)Длительность карантина по педикулезу составляет 30 дней.
- 6)Посещать детский сад ребенку, переболевшему педикулезом, разрешено после посещения поликлиники, о чем свидетельствует справка специалиста.

Средства борьбы

Меры борьбы с педикулезом – это применение противопаразитарных препаратов, разработка которых рассчитана на уничтожение вшей и их яиц (гнид).

Одним из самых эффективных средств является спрей: его можно использовать как для лечения педикулеза, так и в профилактических целях. В состав средства входят инсектицидные компоненты, губительно воздействующие на вшей.

Раствор распыляют по всей длине волос. После чего голову ребенка покрывают полиэтиленовой шапочкой или пакетом и оставляют в таком состоянии на указанное в описании время (его продолжительность зависит от марки средства). Затем волосы моют с использованием ежедневного шампуня, а погибших вшей и гнид удаляют с волос при помощи специального гребня.

Педикулицидный шампунь – самое безопасное средство, которое часто используют в профилактических целях. Чтобы защититься от эпидемии педикулеза, достаточно им регулярно мыть голову не только ребенку, но и всем членам семьи.